

KOMPLEKSOWA OCHRONA BYDŁA

Cieleta i krowy mleczne

ROLVET
marka zdrowia

Szanowni Państwo

Na rynku produktów farmaceutycznych oraz wspomagających leczenie i hodowlę zwierząt firma Rolvet działa od 1991 roku. Mając bogate doświadczenie i wiedzę, staramy się proponować Państwu preparaty starannie wyselekcjonowane pod względem skuteczności działania, ekonomiki stosowania oraz nowoczesnego spojrzenia na problemy produkcji wielkotowarowej. Oferowane preparaty są dokładnie przebadane, posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Dzięki temu mają Państwo gwarancję bezpieczeństwa, że sprzedawane przez nas produkty charakteryzują się najwyższą jakością oraz są niezwykle pomocne w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Cielęta

Krowy mleczne

Zaleganie okołoporodowe

Ochrona wymion

Aerozole

Żel eksploatacyjny

1

BOVIFERM® plus SID

Mieszanka paszowa dietetyczna, nawadniająca, do wymieszania z mlekiem, przeznaczona dla cieląt z biegunką

Stosowanie: w przypadku ryzyka wystąpienia lub w okresach wystąpienia zaburzeń trawienia (biegunka) podawać 2 razy dziennie. 1 saszetkę (115 g) rozpuścić w 2 litrach wody, a następnie dodać do objętości 0,5–4 litrów mleka lub preparatu mlekozastępczego (w zależności od dziennego zapotrzebowania cielaka).

Skład: serwatka w proszku, chlorek sodu, pulpa bananowa, dekstroza, chlorek potasu, mączka ryżowa, anyż, koper, chlorek wapnia, chlorek magnezu. Dodatki w 1 kg: witamina A 175 000 I.U., witamina E 440 mg, selen 1 mg, enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 (13) ORALIN® 1,75x10⁹ CFU/g, cytrynian sodu, propionian sodu, mączka z nasion guar, pektyny z owoców cytrusowych, bentonit.

Postać: mieszanka proszkowa.

Wskazania: biegunka.

Opakowanie: 115 g.

Opakowanie zbiorcze: 24x115 g.

2

BIOCOLOST® B

Stymulator immunologiczny dla nowonarodzonych cieląt, uzupełniający niedobór przeciwciał siarowych

Stosowanie: zawiesina gotowa do użycia: cielęta – 1 butelka (100 ml) na 1 cielę, jagnięta – 10 ml (dostępna pipeta) na jagnię. Należy podawać doustnie, bezpośrednio po narodzinach, nie później niż w ciągu pierwszych 6 godzin po narodzeniu. W przypadku objawów biegunki, podzielić dawkę na 2 części podawane podczas dwóch posiłków.

Skład: serwatka z siary, laktoza.

Postać: zawiesina płynna.

Wskazania: zawiera wysoki poziom immunoglobulin (12 tys. mg w 100 ml) oraz przeciwciał siarowych, uzupełnia niepełnowartościową siarę, podawany tuż po narodzeniu wyrównuje deficyt immunologiczny oraz zapobiega przypadkom wystąpienia biegunki.

Opakowanie: butelka zawierająca 100 ml, z załączonym smoczkiem, zamknięta aluminiowym kapsłem z dołączoną szprycą do nakłucia kapsla.

Opakowanie zbiorcze: 24x100 g.

Nawodnienie Immuno- stymulacja Stabilizacja jelit



CIELETA

3

BOVIFERM® primo 1x1

Stabilizator flory bakteryjnej jelit, wspomagający fizjologiczne procesy trawienia mleka u cieląt w pierwszych tygodniach życia

Stosowanie: podawać doustnie 1 strzykawkę (12 ml) na cielę, po pierwszym spożyciu siary, po terapii antybiotykowej lub w okresie rekonwalescencji. W razie konieczności podawanie należy powtórzyć po kilku dniach. W związku z wysokim stężeniem wit. D3, żelaza, selenu oraz Enterococcus faecium dzienna dawka nie może przekroczyć 12 ml na 1 cielę (maksymalny wiek: 6 miesięcy).

Skład: olej rzepakowy, olej arachidowy, Dodatki w 1 litrze: witamina A 208,000,000 I.U. witamina C 208,00 mg, witamina D3 2000,00 I.U. witamina E 208,000 mg, betakaroten 12 500 mg, żelazo jako chylat z aminokwasami, wodzian

8,333 mg, selen 41,7 mg, enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB (E 1707) (ORALIN®) 3 x 10¹¹ CFU.

Postać: zawiesina w tubostrzykawce, do podawania doustnego.

Wskazania: stabilizacja flory bakteryjnej jelit, stymulacja układu odpornościowego, zapobieganie dystrofii mięśniowej, zwiększenie produkcji czerwonych krwinek, wzmocnienie vitalności.

Opakowanie: tubostrzykawka zawierająca 12 ml.

Opakowanie zbiorcze: 12 x 12ml.



Zaleganie okołoporodowe



KROWY MLECZNE

1

PHOSPHOR-BOVISAL

Nowa koncepcja terapii zalegania okołoporodowego stosowana każdorazowo po dożylnym wlewie wapnia

Stosowanie: wlać jedną butelkę bezpośrednio do pyska, po dożylnym wlewie wapnia. Jeżeli krowa nadal zalega, po 5-8 godzinach (bardzo rzadko) należy podać kolejną butelkę (po ponownym dożylnym wlewie preparatu wapniowego).

Skład: 45 g fosforu, 55 g wapnia w każdej butelce po 500 ml.

Postać: płynna mieszanka paszowa.

Wskazania: u około 30% krów z zaleganiem okołoporodowym potwierdzono niedobór fosforu. Połowa krów cierpiących z powodu zalegania wykazuje znaczny poniżej normalnego poziomu niedobór wapnia i fosforu. Skraca czas zalegania, wzmacnia efekt terapii pierwszym wlewie dożylnym wapnia do ponad 90%.

Opakowanie: butelka o poj. 500 ml.

2

CALCIUM-BOVISAL

Nowa koncepcja zapobiegania zalegania okołoporodowego stosowana przed i po wycieleniu

Stosowanie: podawać 1 butelkę bezpośrednio do pyska: 12 godz. przed wycieleniem, bezpośrednio po wycieleniu, 8-12 godz. po wycieleniu, 20-24 godz. po wycieleniu.

Skład: minerały, propionian wapnia, kwas mrówkowy, kwas propionowy. 50 g wapnia i 3.1 MJ energii w każdej butelce po 500 ml.

Postać: płynna mieszanka paszowa.

Wskazania: w początkach laktacji krowa ma wysokie zapotrzebowanie na wapń i energię. Deficyt wapnia i/lub energii prowadzi do licznych chorób okresu okołoporodowego, włącznie z zaleganiem (zaleganie okołoporodowe, gorączka mleczna), mastitis, ketoza, zatrzymanie łożyska.

Opakowanie: butelka o poj. 500 ml.

1

EUVITAL

Balsam do intensywnej pielęgnacji wymion, zawiera olejek japońskiej mięty pieprzowej

Stosowanie: po udoju wcierać kolistymi ruchami w skórę wymienia.

Skład: woda; olejek mięty pieprzowej; C12-15 pareth-12; sorbitan trioleate; glikol propylenowy; carbomer; triethanolamine; benzoesan sodu.


Postać: krem gotowy do użycia.

Wskazania: produkt naturalny, intensywnie działający, zawiera olejek japońskiej mięty pieprzowej. Pobudza skórę wymienia do proliferacji komórek warstwy ochronnej naskórka, co daje film zabezpieczający przed uszkodzeniami i wysychaniem oraz utrzymuje wymię w odpowiedniej kondycji zdrowotnej. Działa chłodząco.

Właściwości i działanie: skojarzone działanie substancji aktywnych likwiduje okołoporodowy obrzęk wymienia oraz działa wspomagająco w stanach zapalnych wymion, mięśni i ścięgien. Nawilża skórę czyniąc ją elastyczną, jędrną i odporną na urazy.

Opakowanie: tuba do zawieszania, zawierająca 500ml.

Ochrona wymion



KROWY MLECZNE



2

EUTERGEL

Żelowy balsam do pielęgnacji wymion. Pobudza krążenie krwi, działa przeciwko muchom i insektom

Stosowanie: przed nałożeniem żelu podrażniona skóra wymienia powinna być czysta i sucha. Nanieść odpowiednią ilość żelu i wmasować. Regularne stosowanie przynosi oczekiwane rezultaty.

Skład: izopropanol, olej eukaliptusowy.

Postać: żel.

Wskazania: ochrona wymienia przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, podrażnienia spowodowane przez urządzenia ssące i cielęta.

Właściwości i działanie: pobudza krążenie krwi, pielęgnuje wymiona w okresie pastwiskowym, działa przeciwko muchom i insektom. Do użytku zewnętrznego po udoju lub też u krów nieprodukujących mleka.

Opakowanie: 250 g, 1000 g.

3

EUTACID

Krem o działaniu przeciwobrzętkowym, ściągającym, odstrasżającym owady, do higieny i pielęgnacji skóry wymion.

Stosowanie: wmasować w skórę wymion i strzyków po każdym udoju. Powtórzyć od 4 do 6 razy. Celem uzyskania wysokiej ochrony wymienia stosować Eutacid raz w tygodniu w celach profilaktycznych. Nie przenika do mleka.

Skład: octan glinu, arnika, rumianek, kwas octowy i kwas winny.

Postać: krem.

Wskazania: środek z wyciągami roślinnymi, stosowany w celu intensywnej pielęgnacji wymion u krów w okresie laktacji i zaszuszenia oraz zwierząt przebywających na pastwiskach.

Właściwości i działanie: Eutacid jest dobrze znanym i długo działającym produktem opartym o ekstrakty roślinne o skojarzonym działaniu przeciwobrzętkowym, ściągającym, przeciwzapalnym i odstrasżającym owady.

Opakowanie: 1000 g.

4

EUMASAL

Krem do ochrony i codziennej pielęgnacji mięśni i ścięgien oraz skóry wymion i strzyków u krów mlecznych

Stosowanie: wmasować w skórę wymion i strzyków po każdym doju. Nie przenika do mleka.

Skład: kamfora, salicylan metylu, gliceryna.

Postać: krem.

Wskazania: codzienna pielęgnacja wymion, zwłaszcza u krów mlecznych wysokoprodukcyjnych.

Właściwości i działanie: skojarzone działanie substancji aktywnych likwiduje okołoporodowy obrzęk wymienia oraz działa wspomagająco w stanach zapalnych wymion, mięśni i ścięgien. Nawilża skórę czyniąc ją elastyczną, jędrną i odporną na urazy.

Opakowanie: 250 g, 1000 g, 2500 g.

Aerozole



KROWY MLECZNE CIEŁĘTA

1

GOLD PLASTER

Aerzolowa zawiesina wspomagająca gojenie ubytków tkankowych

Stosowanie: miejsce aplikacji dokładnie oczyścić, następnie pokryć całkowicie preparatem. Stosować aż do uzyskania trwałych efektów gojenia.

Skład: tlenek żelaza, dwutlenek tytanu, miedź, mirystynian izopropylu, alkohol poliwinylkaprolactamowy, octan etylu, flakon pod ciśnieniem zawiera gaz propan\butan.

Postać: zawiesina w aerzolu.

Wskazania: wspomagająco w gojeniu ubytków tkankowych u zwierząt. Działanie ochronne, przynosi uczucie ulgi.

Opakowanie: puszkki z aerzolem o poj. 200 ml.

2

SKIN CARE

Aerzolowa maść działająca ochronnie na skórę

Stosowanie: stosowanie produktu SKIN CARE pielęgnuje i wspomaga leczenie trudno gojących się ubytków mikrourazów skóry. Stosować na suchą, szorstką skórę w celu jej ochrony, a także poprawy elastyczności.

Skład: tlenek cynku, trójgliceryd kaprynu, lanolina bezwodna, parafina twarda, chlorofil, glikol propylenowy, gliceryna, pantenol, wyciąg z rumianku (bisabolol), sproszkowane zioła: rumianek, wawrzyn szlachetny, ryż siewny.

Postać: maść w aerzolu.

Wskazania: stosować ochronnie lub zapobiegawczo na skórę suchą, szorstką lub podrażnioną.

Opakowanie: puszkki z aerzolem o poj. 200 ml.

3

POWDER SPRAY

Aerzolowa zasyпка do osuszania miejsc narażonych na działanie bakterii, wirusów i grzybów

Stosowanie: wstrząsnąć przed użyciem, po czym spryskiwać obszar skóry z odległości 10-20 cm tak długo, aż zostanie pokryty warstwą proszku.

Skład: tlenek cynku, talk, triklosan, mirystynian izopropylu, alkohol poliwinylkaprolactamowy, flakon pod ciśnieniem zawiera gaz propan\butan.

Postać: zasyпка w aerzolu.

Wskazania: zasyпка o działaniu osuszającym. Dodatkowo zapobiega ropieniu ran i powstawaniu pleśni.

Opakowanie: puszkki z aerzolem o poj. 200 ml.

Żel eksploatacyjny



1



KROWY MLECZNE

1

GLIETAN

Żel eksploatacyjny do badań

Skład: hydroksyetyloceluloza.

Postać: żel.

Wskazania: preparat poślizgowy (badania rektalne, porody, inseminacja).

Opakowanie: butelki o poj. 1 000 g.

OFEROWANE PRODUKTY SĄ:

- skuteczne
- nowoczesne
- zarejestrowane
- dostępne u lekarzy weterynarii

GWARANCJA JAKOŚCI PRODUKTÓW

Centrala
ul. Nowotomska 33
64-310 Lwówek
tel. 061 44 12 200
fax 061 44 12 213

Oddział w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 248
60-166 Poznań
tel. 061 86 85 636
tel./fax 061 66 18 953

Oddział w Świebodzinie
ul. Poznańska 16
66-200 Świebodzin
tel. 068 38 22 161
tel./fax 068 38 19 002



www.rolvet.pl