

BRODITOP[®] KOSTKA

Preparat do zwalczania szczurów i myszy w postaci kostek.

Zawiera 0,005g/100g substancji aktywnej brodifakum (związek z grupy antykoagulantów).

ZAKRES STOSOWANIA

Preparat przeznaczony jest do zwalczania myszy i szczurów w tradycyjnych miejscach ich występowania oraz do specjalistycznego zwalczania szczurów w miejscach takich jak obszary wilgotne, kanały ściekowe i ciekły wodne, budynki użyteczności publicznej oraz komunalne, magazyny towarowe, itp.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Broditop[®] kostka jest skuteczny w zwalczaniu szczurów i myszy bez względu na ich gatunek i wielkość. Pobranie pojedynczej dawki jest śmiertelne dla gryzoni. Trutka zawiera substancję zapachową wabiącą szkodniki, które giną wkrótce po jej zjedzeniu, nie wywołując nieufności u innych osobników z kolonii.

Preparat zawiera również Bitrex*, substancję o gorzkim smaku, zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem przez człowieka lub zwierzęta domowe.

Dawkowanie:

Szczury: rozłożyć trutkę w porcjach po 3- 4 kostki na punkt, w odstępach co 5-10 metrów

Myszy: rozłożyć trutkę w porcjach po 1-2 kostki na punkt, w odstępach co 1-2 metrów

Umieszczać trutkę w karmnikach deratyzacyjnych lub odpowiednich osłonach w celu ochrony przed wilgocią oraz zwierzętami nie objętymi programem zwalczania, jak np. ptaki lub zwierzęta domowe.

Używać rękawic gumowych lub PVC, ponieważ zapach człowieka wzbudza nieufność gryzoni. W miarę prowadzenia akcji deratyzacyjnej wymieniać starą trutkę na świeżą, która ma silniejszy zapach, a przez to bardziej wabi gryzoni. Gdy ustanie pobieranie trutki przez gryzoni, zwalczanie szczurów i myszy należy być uznać za zakończone.

Uwaga!

Stosować trutkę w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt gospodarskich i domowych, ptactwa domowego i dzikiego. Nie stosować przy źródłach ujęć wody pitnej.

PIERWSZA POMOC

W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem; kontaktu z oczami otwarte oczy dokładnie przepłukać wodą przez kilka minut; przy wdychaniu wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, w razie potrzeby zgłosić się do lekarza.

W przypadku połknięcia nie powodować wymiotów. Wypłukać usta wodą. Natychmiast zabrać poszkodowanego do lekarza i pokazać ulotkę informacyjną produktu lub kartę charakterystyki

Wskazania dla lekarza:

Brodifakum jest pośrednim antykoagulantem. W przypadku połknięcia występuje silne zatrucie organizmu.

Antidotum: Witamina K₁. (fytometadion). Inne formy witaminy K są nieskuteczne.

W przypadku spożycia bardzo dużej ilości preparatu przez poszkodowanego wywołać wymioty, wykonać płukanie żołądka.

W razie podejrzenia zatrucia kontrolować czas protrombinowy i poziom hemoglobiny, a w przypadku spadku, podać witaminę K₁. w dawce 10-20 mg (dla dzieci 0,25 mg/kg). Opieka lekarska jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie powróci do normy.

Okres ważności – 3 lata

Pozwolenie MZ Nr 3226/07