

# Probiotyki



## ENTEROFERM® 35G

Dodatek stabilizujący florę bakteryjną jelit, do stosowania w odchowie kur niosek stad reprodukcyjnych i towarowych, brojlerów oraz indyków.

### CO TO JEST ENTEROFERM® 35G I JAK DZIAŁA?

Jest wysoko skoncentrowanym i wysoce efektywnym probiotykiem opartym na żywych szczepach bakteryjnych paciorkowca *Enterococcus faecium* DSM 10663 NCIMB 10415 (Oralin®). Jest to kompletny dodatek do pokarmu, który może być stosowany przez hodowców na fermach.

Biegunka u piskląt to ciągły problem przy masowej hodowli zwierząt. W związku z kontrowersjami związanymi z zakazem stosowania antybiotyków jako stymulatorów wzrostu w paszy, oraz dążenie do produkcji najwyższej jakości mięsa sprawiają, że probiotyk staje się bardzo interesującą alternatywą. Szczepy bakterii *Enterococcus faecium* zawarte w **Enteroferm® 35G** są całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt oraz nie są szkodliwe dla środowiska.

**Enteroferm® 35G** zabezpiecza pisklęta w wysoką dawkę żywych bakterii prekursorów kwasu mlekowego, wystarczająco silnych, aby przeżyć pasażowanie przez żołądek. W kilka minut zaczynają one namnażać się w jelicie cienkim do kilkakrotnej a nawet wielokrotnej liczby co każde 20 minut. Szybki czas namnażania jest szczególnie ważny by wyprzedzić dostęp do komórek bakterii chorobotwórczych. Kwas mlekowy produkowany jako produkt uboczny z ich aktywności zakwasza układ trawienny. Dodatkowo, w efekcie antagonizmu *Enterococcus faecium* budują warstwę ochronną kosmków jelitowych co jest trudne do pokonania dla bakterii grzybów przywierających do błony śluzowej jelit. **Enteroferm® 35G** stabilizuje florę bakteryjną, która jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

**Cel:** Zasiedlanie przewodu pokarmowego ptaków

**Kiedy:**

- w pierwszych godzinach życia piskląt,
- po każdym leczeniu Chemioterapeutykami,
- przy zmianie paszy,
- zmianie warunków środowiskowych,
- przed i po szczepieniu,
- w każdej sytuacji stresowej.

**Efekt:**

- zapewnia zmniejszenie ryzyka zakażeń *Salmonella*,
- wyższą wagę ciała przy odstawieniu do uboju ( przy takim samym okresie tuczu),
- lepszą jakość mięsa

**Dawkowanie i Stosowanie:** \* Broilery i indyki tucz:

- podawać wg wskazań przez 3 kolejne dni.

\* Stada kur niosek w odchowie oraz nieśności:

- w pierwszym tygodniu życia przez 3 dni

- 14-17 dzień życia przez 3 dni

- 16 tydzień przez 3 dni

- w pierwszym tygodniu po przeniesieniu do klatek przez 3 dni

- w szczycie nieśności przez 3 dni

Dawka dzienna na 10 000 ptaków: 2 saszetki

**Opakowanie:** Saszetka zawierająca 100 g.

Dział sprzedaży: Lwówek, ul. Nowotomska 33 Tel. 061 44 12 200-204 Fax 061 44 12 213/205  
Poznań. ul. Grunwaldzka 248 Tel. 061 868 56 36 Fax 061 661 89 53

P  
R  
E  
P  
A  
R  
A  
T  
Y  
  
O  
D  
Ż  
Y  
W  
C  
Z  
E

