

Antikannibal

ROLVET
marka zdrowia

ANTIKANNIBAL SPRAY

Preparat w aerozolu do zwalczania agresji i wydziobywania piór u drobiu oraz kanibalizmu u trzody chlewnej.



Skład: Stearonitrile, Izopropanol.

Wskazania: Produkt stosować w celu zwalczania lub zapobiegania kanibalizmowi, obgryzaniu ogonów i agresywności wśród prosiąt oraz świń, a także wydziobywania piór u drobiu.

Stosowanie: Trzoda chlewna: „... preparat stosowano w okresach, w których pojawiały się pierwsze symptomy agresji. Postępowanie polegało na rozpylaniu Antikannibalu bezpośrednio nad zwierzętami. Po około 10 minutach od rozpylenia preparatu dochodziło do uspokojenia zwierząt i całkowitego zaniku odruchów agresji. Uspokojenie utrzymywało się przez ok. 10-12 godzin, w przypadku warchlaków po tym czasie problem kanibalizmu w zasadzie zanikał. Wtedy gdy dotyczył on pojedynczych zwierząt spryskiwano okolice pogryzień co zdecydowanie zniechęcało agresorów do kanibalizmu. W przypadku łączenia warchlaków w duże grupy tuczników, w dniu łączenia świń spryskiwano preparatem dwukrotnie w odstępie 10-12 godzin. Po dobie tego typu postępowania hierarchia w grupie była już ustalona, tym samym nie dochodziło do walk między zwierzętami. Opisany cykl doświadczeń przeprowadzono w październiku i listopadzie roku 2006. W miesiącu grudniu 2006 postępowania „przeciw kanibalizmowi” nie przeprowadzono czego efektem było pojawienie się tej technopatii. W styczniu 2007 roku doświadczenie powtórzono na 2 grupach warchlaków (po 100 warchlaków w grupie) i 2 grupach tuczników. Postępowanie było analogiczne do opisanego powyżej. Ponownie zaobserwowano zaskakująco dobre rezultaty stosowania Antikannibalu. Trakcie obserwacji nie zarejestrowano żadnych, negatywnych ubocznych skutków działania preparatu. Antikannibal jest preparatem bezpiecznym dla zwierząt, wysoce przydatnym w ograniczaniu problemów związanych z kanibalizmem świń...”

Drób: „...po zastosowaniu preparatu Antikannibal kury w szpitaliku przestały się same dziobać, stwierdził także, że nie dziobią się nawzajem. Zmiany w okolicy kloaki „przysychają” i goją się. Ptaki z zagojonymi urazami będące w szpitaliku przenoszono sukcesywnie do stada. Od momentu rozpoczęcia zabiegów spryskania preparatem Antikannibal w szpitaliku padła tylko 1 kura. W czasie oględzin stada w tym dniu stwierdzono, że w kurniku wśród wszystkich kur przebywają tylko 2 sztuki ze zmianami, u których, po ich złapaniu i oznaczeniu, zastosowano preparat i wpuszczono je do stada. Nie były to kury u których zastosowano Antikannibal. Właściciel stwierdził, że Antikannibal to „dobra sprawa” i jest zadowolony z efektów jego stosowania...” W przypadku stwierdzenia pterofagii i należy spryskać preparatem uszkodzone części i piór. Czynność powtarzać w zależności od potrzeb, aż do uzyskania efektu.

Postać: aerozol do bezpośredniego stosowania

Opakowanie: Puszka z aerozolem o pojemności 400 ml.

P
I
E
L
Ę
G
N
A
C
J
A

